


Comunicación celular



Erick Suclupe Farro

esuclupe@usat.edu.pe


Biología Celular y Molecular.

COMUNICACIÓN INTERCELULAR



Comunicación Intercelular

- *Ninguna célula vive aislada. En todos los organismos multicelulares, donde se alcanza el grado más elevado de complejidad en la comunicación célula a célula, la supervivencia depende de una red compleja de comunicaciones intercelulares que coordinan en las células su crecimiento, diferenciación y metabolismo.




Introducción


- Las células necesitan percibir su entorno y responder a él. Una célula debe ser capaz de localizar los nutrientes, diferenciar entre la luz y la oscuridad y evitar sustancias tóxicas y predadores.
- Las células deben interpretar la gran cantidad de señales que reciben de otras células para poder coordinar sus comportamientos.
- **La función principal de la comunicación celular es la de adaptarse a los cambios que existen en el medio que les rodea para sobrevivir, esto es gracias al fenómeno de la homeostásis.**

- La comunicación intercelular tiene “protagonistas”:

A quién va el mensaje?



Célula que genera un mensaje:
En forma de moléculas:
pequeños como iones o
grandes como hormonas




Puede ser una:



- Vecina:
- Lejana o cercana:
- Ella misma:

y el mensaje es interpretado como una instrucción para modificar algún aspecto funcional de la célula blanco.


¿Cómo se comunican las células?

- Las células poseen en la membrana plasmática un tipo de proteínas específicas llamadas **receptores**, encargadas de recibir señales físico-químicas del exterior celular.







Neutrophil



Necesitamos
unirnos!




Plaqueta




Macrophage


Oye tú Neutrófilo,
plaquetas vengán
rápido hay una
lesión!!!



¿ A quien debo
escuchar ?



Hey tu macrógafo !!!
¿Podrías migrar?




TIPOS DE COMUNICACION

Pero la transmisión de los mensajes depende solo de unos pocos estilos básicos de comunicación que son:


- Endocrina
- Paracrina
- Yuxtacrina
- Autocrina

Endocrina



- Son aquellas que actúan sobre células blanco distantes del sitio u órgano de síntesis y viajan a través del **torrente sanguíneo**. Las **moléculas** que utilizan este tipo de comunicación son las **hormonas**.


Comunicación endocrina




Paracrina

- Son aquellas moléculas liberadas por una célula y que afectan sólo a las células que se encuentran en la proximidad inmediata. Así actúan como mediadores locales sobre las células vecinas.

Comunicación paracrina




Neurotransmisión



Yuxtacrina


- Son proteínas ancladas en la superficie de la membrana plasmática de una célula que pueden interaccionar directamente con los receptores en la superficie de la célula adyacente.




Comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto

Célula emisora

Células blanco



**Molécula
señal unida a
membrana**




comunicacion intercelular; 2003, p. 75)

Tomado de: (Dvorkin & Cardinali, comunicacion intercelular; 2003, p. 75)

Autocrina

- Es la situación en que las células responden a moléculas que ellas mismas producen.



Sitios blanco en la misma célula

Cuadro 16-1. Algunos ejemplos de moléculas señalizadoras

MOLÉCULA SEÑALIZADORA	LUGAR DE ORIGEN	NATURALEZA QUÍMICA	ALGUNAS ACCIONES
Hormonas			
<i>Adrenalina</i> (epinefrina)	Glándula suprarrenal	Derivado del aminoácido tirosina	Aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el metabolismo
<i>Cortisol</i>	Glándula suprarrenal	Esteroides (derivado del colesterol)	Afecta el metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos en la mayoría de los tejidos
<i>Estradiol</i>	Ovario	Esteroides (derivado del colesterol)	Induce y mantiene los caracteres sexuales secundarios femeninos
<i>Glucagón</i>	Células α del páncreas	Péptido	Estimula la síntesis de glucosa y la degradación del glucógeno y de los lípidos por ejemplo, en las células hepáticas y en las células adiposas
<i>Insulina</i>	Células β del páncreas	Proteína	Estimula la captación de glucosa y la síntesis de proteínas y de lípidos, por ejemplo, en las células hepáticas
<i>Testosterona</i>	Testículos	Esteroides (derivado del colesterol)	Induce y mantiene los caracteres sexuales secundarios en el hombre
<i>Hormona tiroidea</i> (tiroxina)	Glándula tiroidea	Derivado del aminoácido tirosina	Estimula el metabolismo de muchos tipos celulares

Mediadores locales

<i>Factor de crecimiento epidérmico (EGF)</i>	Células diversas	Proteína	Estimula la proliferación de las células epidérmicas y de muchos otros tipos celulares
<i>Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)</i>	Células diversas, incluidas las plaquetas	Proteína	Estimula la proliferación de muchos tipos celulares
<i>Factor de crecimiento nervioso (NGF)</i>	Diversos tejidos inervados	Proteína	Promueve la supervivencia de ciertas clases de neuronas; promueve el crecimiento de sus axones
<i>Factor de crecimiento transformador β (TGF-β)</i>	Muchos tipos celulares	Proteína	Inhibe la proliferación celular; estimula la producción de matriz extracelular
<i>Histamina</i>	Mastocitos	Derivado del aminoácido histidina	Dilata y permeabiliza los vasos sanguíneos y por ende contribuye a la inflamación
<i>Óxido nítrico (NO)</i>	Células nerviosas; células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos	Gas disuelto	Relaja las células del músculo liso; regula la actividad de las células nerviosas

Neurotransmisores


<i>Acetilcolina</i>	Terminaciones nerviosas	Derivado de la colina	Neurotransmisor excitador en muchas sinapsis neuromusculares y en el sistema nervioso central
<i>Ácido γ-aminobutírico (GABA)</i>	Terminaciones nerviosas	Derivado del aminoácido ácido glutámico	Neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central

Moléculas señalizadoras dependientes del contacto

<i>Delta</i>	Futuras neuronas; otros tipos celulares en desarrollo	Proteína transmembrana	Inhibe la especialización de células vecinas del mismo modo que la célula señalizadora
--------------	---	------------------------	--

Las señales que reciben las células pueden hacer en éstas:

- Inducir cambios metabólicos
- Modificar la expresión de algunos genes
- Alargar la vida o provocar la muerte
- Generar nuevas señales para otras células
- Influir en gran medida en su diferenciación, migración y desarrollo




PRINCIPIOS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN INTERCELULAR


- 1) Síntesis celular del mensajero químico.
- 2) Secreción del mensajero por la célula emisora.
- 3) Transporte del mensajero hasta la célula blanco.
- 4) Detección / recepción del mensajero (señal) por un receptor celular (proteína)
- 5) Transmisión intracelular de la señal (transducción de señal) y cambio en el status celular (metabolismo, expresión génica, etc.)
- 6) Eliminación (degradación) de la señal (interrupción del proceso).

- En los organismos unicelulares y pluricelulares las células utilizan centenares de tipos de moléculas extracelulares para enviarse señales: proteínas, péptidos, aminoácido, nucleótidos, esteroides e incluso gases disueltos.

La Transducción de Señales es el proceso por el que un tipo de señal es convertido en otro.



(A) Un teléfono convierte una señal eléctrica en una señal sonora.




(B) Una célula blanco convierte una señal extracelular (molécula A) en una señal intracelular (molécula B).


Receptores

- La recepción de la señal comienza cuando una señal originada en el exterior de la célula diana encuentra una molécula diana perteneciente a esta célula, reconoce al mensajero extracelular y transducen al ambiente intracelular.

Receptores




Las moléculas señaladoras son hidrofílicas y no tienen la habilidad de difundir a través de la MP. Necesitan de un receptor de superficie celular que genera una señal intracelular en la célula diana.




Algunas moléculas señaladoras hidrofóbica (hormonas) pueden difundir a través de la MP y unirse a receptores intracelulares localizados en el núcleo o en el citoplasma de la célula diana.

Todos los receptores son proteínas

MOLÉCULAS DE COMUNICACIÓN CELULAR




- Generalmente, el receptor es una **proteína** que puede estar localizada en la **superficie** de la célula blanco, el **citósol** o su **núcleo** y cada receptor se activa por un solo tipo de señal.







Recuerda....

La señales que tienen sus receptores intracelulares producen cambios a largo plazo, mientras que las señales que tienen receptores en la membrana plasmática tienden a producir efectos de más corta duración.

Señalización intracelular



La misma señal química puede inducir diferentes respuestas en diferentes células blanco



- Cada tipo celular presenta un conjunto de proteínas receptoras que les permiten responder a un grupo específico de moléculas señalizadoras producidas por otras células.

- Estas moléculas señalizadoras trabajan juntas para regular el comportamiento de la célula.
- Se puede afirmar que si una célula no tiene receptores para determinada señal no emitirán ninguna respuesta.

Los receptores se pueden agrupar en las siguientes categorías:

1.- Receptores de membrana plasmática:

- Receptores que son canales iónicos
- Receptores asociados a proteínas G
- Receptores con actividad enzimática intrínseca
- Receptores que se asocian a enzimas
- Receptores vinculados a procesos de endocitosis

2.- Receptores intracelulares


- Citoplasmáticos
- Intranucleares

Clasificación de Receptores de la superficie celular

*Se conocen 3 clases de proteínas receptoras de superficie celular:

Receptores acoplados a proteína G	La familia más numerosa de receptores de superficie celular, transmite las señales al interior de las células a través de proteínas.
Receptores de canales iónicos	Mediada por un pequeño número de neurotransmisores que abren o cierran transitoriamente el canal iónico al que están unidos.
Asociadas a enzimas	Cuando son activadas por su ligando estos receptores actúan como enzimas o están asociados a enzimas. Lugar de unión del ligando en el exterior y el lugar catalítico en el interior.

Receptores por canales iónicos



El receptor asociado con canales iónicos se abren o se cierran en respuesta a la unión de su molécula señalada.


Receptores asociados con proteínas G

Las proteínas-G pueden unir GTP (guanosina trifosfato) cuando estimulado por una hormona, se une a una proteína receptora. La proteína-G activada pasa un grupo fosfato a una enzima inactiva. La recién fosforilada enzima cambia de forma y se vuelve activa, y cataliza muchas reacciones enzimáticas. Las proteínas-G son socios en la activación de patrones de hormonas comunes, como el glucagon (hormona que segrega el páncreas), epinefrina y serotonina.


Clasificación

- *Debido a su estructura molecular, las proteínas G se clasifican en:
- *Grandes o heterotriméricas, constituidas por tres subunidades distintas, denominadas $\alpha\beta\gamma$. Se trata de proteínas ancladas a membrana, aunque no integrales de membrana.
- *Pequeñas o monoméricas, con una única subunidad, libres en el citosol y nucleoplasma.


(A) RECEPTOR ASOCIADO A UN CANAL IÓNICO




(B) RECEPTOR ASOCIADO A PROTEÍNAS G




(C) RECEPTORES ASOCIADOS A ENZIMAS




Paso 1. Una hormona viaja a través del sistema circulatorio a las células del cuerpo. Cuando la hormona encuentra una proteína receptora específica, se une en el lado extracelular del receptor, causando un cambio conformacional en la proteína que afecta la forma intracelular




Paso 2. La proteína-G se mueve a lo largo de la membrana y se une con el receptor hormonal activado. Este evento dispara un intercambio de GDP por una molécula de GTP en la proteína-G.



Paso 3. La proteína-G se mueve lateralmente a lo largo de la membrana y se une a una enzima inactiva. El grupo fosfato terminal del GTP es transferido a la enzima, formando una enzima fosforilada. Este evento causa un cambio en el sitio activo, haciendo a la enzima catalíticamente activa



Paso 4. La enzima activa es ahora capaz de catalizar una reacción. Algunas enzimas activadas por la proteína-G producen mensajeros secundarios que activan otras clases de enzimas no activas. La proteína-G ahora contiene GDP, no GTP, por eso no puede activar inmediatamente otra enzima. Si la hormona está aun presente, la proteína-G puede volver a activarla



Transducción intracelular de señales

- *Proceso por medio del cual la información que llega a la célula es transmitida al interior de ella.
- *Cadena de reacciones que transmiten señales químicas desde la superficie celular a sus objetivos intracelulares.
- *La naturaleza del estímulo recibido es totalmente diferente a la señal liberada en el interior de la célula.
- *La molécula señal no es transferida a través de la membrana; sólo, se transmite la señal.

- *En la transducción de señales intervienen sistemas mensajeros.
- *El primer mensajero (ligando) se une al receptor de membrana.
- *Esta unión estimula la producción del segundo mensajero en el interior de la célula.

Segundos mensajeros

- * Es liberado después de la activación de una vía de transducción de señales.
- * Desencadena una cascada enzimática (una molécula transforma a otra, y esta a otra, y esta a otra y así sucesivamente). Ocurre un efecto biológico.
- * Esta cascada de reacciones transmite la señal desde la superficie celular hasta diferentes blancos intercelulares.

Lógica molecular de transducción de señales

□ Segundos mensajeros (ejemplos)

1. AMPc – monofosfato de adenosina cíclico
2. GMPc - monofosfato de guanosina cíclico
3. Ca^{2+} - calcio
4. IP_3 – inositol trifosfato
5. DAG - diacilglicerol
- 6. NO – óxido nítrico
- 7. CO – monóxido de carbono
- 8. Ácido araquidónico (AA) y sus metabolitos (eicosanoides)

Segundos mensajeros

- **Monofosfato de adenosina cíclico (AMPc).**

Actúa como segundo mensajero intracelular y participa en respuestas hormonales, como son: movilización de energía almacenada, homeostasis de calcio, aumento en la frecuencia y frecuencia contráctil del miocardio, síntesis de hormonas sexuales y suprarrenales, relajación del músculo liso entre muchas mas.

Ejerce la mayoría de sus efectos por medio de la estimulación de cinasas de proteína dependiente de AMPc


SISTEMA DE FOSFOLÍPIDOS DE LA MEMBRANA CELULAR

Algunas sustancias activan la enzima fosfolipasa C.

Cataliza la degradación de algunos fosfolípidos (bifosfato de fosfatidilcolina- PIP_2)

Forma dos segundos mensajeros:

- Trifosfato de inositol (IP_3)
- Diacilglicerol



Hall: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th Edition

SISTEMA DE FOSFOLÍPIDOS DE LA MEMBRANA CELULAR

Trifosfato de Inositol- IP_3 :

Moviliza iones de calcio de la mitocondria y del RE.

Diacilglicerol- DAG:

- Activa la enzima proteina cinasa (PKC).
- Fosforila diversas proteínas.
- Activa cascadas enzimáticas.

Conclusión

*El cuerpo de un animal puede contemplarse como una sociedad o ecosistema, cuyos miembros son células, que se organizan en conjuntos cooperativos denominados tejidos, que a su vez, se asocian formando grandes unidades funcionales denominados órganos. De este modo, podríamos asemejar una célula con un individuo, el cual establece una vida social, necesita comunicarse con otros y relacionarse con su ambiente, respondiendo a distintos estímulos. Así, para que una persona pueda pensar, actuar o, simplemente, existir, las células de su cuerpo deben comunicarse entre sí; comunicación que efectúan poniendo en marcha una especializada maquinaria de intercambio de información físico-química, denominada Comunicación Intercelular.

Bibliografía:

- *Biología molecular de la Célula
- Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, James D. Watson
- Tercera edición, 1996-2002 .Ediciones Omega, S.A



Erick Suclupe Farro
esuclupe@usat.edu.pe



<http://www.facebook.com/usat.peru>



<https://twitter.com/usatenlinea>



<https://www.youtube.com/user/tvusat>



<https://plus.google.com/+usateduperu>